レジメン名：254S＋5-FU療法（末梢）

静岡県立静岡がんセンター

2026年3月23日 改訂

消化器内科　　対象疾患：食道がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（2）	day（3）	day（4）	day（5）	day（6）
No.1	フルオロウラシル注	800mg/㎡	持続点滴末梢	24時間で	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	
	ラクテック注	1000mL								
No.2	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	点滴末梢（側管）	15分で	10:45					
	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL								
No.3	アクプラ静注用	90mg/㎡	点滴末梢（側管）	90分で	11:00					
	生理食塩液（一次溶解液）									
	5%ブドウ糖液	250mL								
No.4	プリンペラン注10mg2mL	20mg	点滴末梢（側管）	30分で		10:30	10:30	10:30	10:30	
	生理食塩液	100mL								
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で						化学療法終了時

インターバル日数：　28日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	フルオロウラシル注	800mg/㎡	800mg/㎡
No.3	アクプラ静注用	90mg/㎡	90mg/㎡

備考