

# レジメン名:FP-R後治療療法(末梢)

静岡県立静岡がんセンター

2021年12月15日 改訂

消化器内科

対象疾患:食道がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)
No.1	フルオロウラシル注	800mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	24時間で	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	
	ソルデム3A輸液	500mL								
	ラクテック注	1000mL								
No.2	硫酸Mg補正液20mEq/20mL	20mL	点滴末梢(側管)	2時間で	10:30					
	ラクテック注	500mL								
No.3	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	点滴末梢(側管)	15分で	12:30					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL								
No.4	シスプラチン注	80mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢(側管)	2時間で	12:45					
	生理食塩液	300mL								
No.5	生理食塩液	500mL	点滴末梢(側管)	2時間で	14:45					
No.6	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢(側管)	15分で		10:30	10:30	10:30		
	生理食塩液	50mL								
No.7	生理食塩液	1000mL	点滴末梢(側管)	5時間で		10:45	10:45	10:45	10:45	
No.8	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で						10:30

インターバル日数: 28日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	フルオロウラシル注	800mg/m <sup>2</sup>	800mg/m <sup>2</sup>
No.4	シスプラチン注	80mg/m <sup>2</sup>	80mg/m <sup>2</sup>

備考
アプレピタント内服