レジメン名：FP−R後治療療法（末梢）

静岡県立静岡がんセンター

2021年12月15日 改訂

消化器内科　　対象疾患：食道がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（2）	day（3）	day（4）	day（5）	day（6）
No.1	フルオロウラシル注	800mg/㎡	点滴末梢	24時間で	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	
	ソルデム3A輸液	500mL								
	ラクテック注	1000mL								
No.2	硫酸Mg補正液20mEq/20mL	20mL	点滴末梢（側管）	2時間で	10:30					
	ラクテック注	500mL								
No.3	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	点滴末梢（側管）	15分で	12:30					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL								
No.4	シスプラチン注	80mg/㎡	点滴末梢（側管）	2時間で	12:45					
	生理食塩液	300mL								
No.5	生理食塩液	500mL	点滴末梢（側管）	2時間で	14:45					
No.6	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢（側管）	15分で		10:30	10:30	10:30		
	生理食塩液	50mL								
No.7	生理食塩液	1000mL	点滴末梢（側管）	5時間で		10:45	10:45	10:45	10:45	
No.8	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で						10:30

インターバル日数：　28日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	フルオロウラシル注	800mg/㎡	800mg/㎡
No.4	シスプラチン注	80mg/㎡	80mg/㎡

備考
アプレピタント内服