レジメン名：New FP-R療法　Phase　Ⅰ（Level 2）

静岡県立静岡がんセンター

2026年6月1日 改訂

消化器内科　　対象疾患：食道がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（2）	day（3）	day（4）	day（5）
No.1	フルオロウラシル注	1000mg/㎡	持続点滴末梢	24時間で	10:30	10:30	10:30	10:30	
	ソルデム3A輸液	1000mL							
No.2	硫酸Mg補正液20mEq/20mL	20mL	点滴末梢（側管）	2時間で	10:30				
	ラクテック注	500mL							
No.3	生理食塩液	50mL	点滴末梢（側管）	5分で	12:30				
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	点滴末梢（側管）	30分で	12:35				
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL							
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL							
No.5	シスプラチン注	75mg/㎡	点滴末梢（側管）	2時間で	13:05				
	生理食塩液	300mL							
No.6	生理食塩液	500mL	点滴末梢（側管）	6時間で	15:05				
	ラクテック注	1000mL							
No.7	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢（側管）	15分で		10:30	10:30	10:30	
	生理食塩液	50mL							
No.8	生理食塩液	1000mL	点滴末梢（側管）	8時間で		10:45	10:45	10:45	
	ソルデム3A輸液	1000mL							
No.9	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で					10:30

インターバル日数：　28日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	フルオロウラシル注	1000mg/㎡	1000mg/㎡
No.5	シスプラチン注	75mg/㎡	75mg/㎡

備考