

# レジメン名 : New FP-R療法 Phase I【Level 2】

静岡県立静岡がんセンター

2021年12月15日 改訂

消化器内科

対象疾患 : 食道がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
No.1	フルオロウラシル注	1000mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	24時間で	10:30	10:30	10:30	10:30	
	ソルデム3A輸液	1000mL							
	ラクテック注	1000mL							
No.2	硫酸Mg補正液20mEq/20mL	20mL	点滴末梢(側管)	2時間で	10:30				
	ラクテック注	500mL							
No.3	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	点滴末梢(側管)	15分で	12:30				
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL							
No.4	シスプラチン注	75mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢(側管)	2時間で	12:45				
	生理食塩液	300mL							
No.5	生理食塩液	500mL	点滴末梢(側管)	2時間で	14:45				
No.6	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢(側管)	15分で		10:30	10:30	10:30	
	生理食塩液	50mL							
No.7	生理食塩液	1000mL	点滴末梢(側管)	5時間で		10:45	10:45	10:45	
No.8	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で					10:30

インターバル日数: 28日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	フルオロウラシル注	1000mg/m <sup>2</sup>	1000mg/m <sup>2</sup>
No.4	シスプラチン注	75mg/m <sup>2</sup>	75mg/m <sup>2</sup>

備考
アプレピタント内服