レジメン名：Pembrolizumab＋5-FU＋CBDCA療法

静岡県立静岡がんセンター

2026年3月25日 改訂

消化器内科　　対象疾患：頭頸部がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（2）	day（3）	day（4）	day（5）
No.1	キイトルーダ点滴静注	200mg	持続点滴末梢	30分で	10:00				
	生理食塩液 100mL	100mL							
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	10分で	10:30				
No.3	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	10:40				
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL							
No.4	カルボプラチン注射液	AUC5	持続点滴末梢	60分で	10:55				
	生理食塩液	500mL							
No.5	フルオロウラシル注	1000mg/㎡	持続点滴末梢	24時間で	11:55	11:55	11:55	11:55	
	生理食塩液	1000mL							
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	10分で					11:55

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	キイトルーダ点滴静注	200mg	200mg
No.4	カルボプラチン注射液	AUC5	650mg
No.5	フルオロウラシル注	1000mg/㎡	1000mg/㎡

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出