

レジメン名 : Pembrolizumab + 5-FU + CBDCA療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年12月15日 改訂

消化器内科

対象疾患: 頭頸部がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
No.1	キイトルーダ点滴静注 生理食塩液 100mL	200mg 100mL	持続点滴末梢	30分で	10:00				
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	10分で	10:30				
No.3	デキサート注射液3.3mg/mL アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	2mL 50mL	持続点滴末梢	15分で	10:40				
No.4	カルボプラチン点滴静注液 生理食塩液	AUC5 500mL	持続点滴末梢	60分で	10:55				
No.5	フルオロウラシル注 ソルデム3A輸液 生理食塩液	1000mg/m ² 1000mL 1000mL	持続点滴末梢	24時間で	11:55	11:55	11:55	11:55	
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	10分で					11:55

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	キイトルーダ点滴静注	200mg	200mg
No.4	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	650mg
No.5	フルオロウラシル注	1000mg/m ²	1000mg/m ²

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出