

レジメン名 : Pembrolizumab + 5-FU + CDDP療法

静岡県立静岡がんセンター

2021年12月15日 改訂

消化器内科

対象疾患: 頭頸部がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
No.1	キイトルーダ点滴静注 生理食塩液 100mL	200mg 100mL	持続点滴末梢	30分で	10:00				
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	10分で	10:30				
No.3	生理食塩液	1000mL	持続点滴末梢(側管)	240分で	10:00				
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL プリンペラン注10mg2mL アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	3mL 30mg 50mL	持続点滴末梢	30分で	12:00				
No.5	デキサート注射液3.3mg/mL プリンペラン注10mg2mL 生理食塩液	2mL 30mg 100mL	持続点滴末梢(側管)	60分で		10:30	10:30	10:30	
No.6	シスプラチン注 生理食塩液	100mg/m ² 全量500mL	持続点滴末梢	60分で	12:30				
No.7	フルオロウラシル注 ソルデム3A輸液 生理食塩液	1000mg/m ² 1000mL 1000mL	持続点滴末梢	24時間で	13:30	13:30	13:30	13:30	
No.8	15%マンニトールS注射液	300mL	持続点滴末梢(側管)	90分で	14:00				
No.9	ソルデム3A輸液	500mL	持続点滴末梢(側管)	300分で	15:30				
No.10	ソルデム3A輸液	1000mL	持続点滴末梢(側管)	300分で		15:30	15:30	15:30	
No.11	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	10分で					13:30

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.1	キイトルーダ点滴静注	200mg	200mg
No.6	シスプラチン注	100mg/m ²	100mg/m ²
No.7	フルオロウラシル注	1000mg/m ²	1000mg/m ²

備考
アプレピタント内服