レジメン名： mFOLFIRINOX末梢療法（アトロピン無）

静岡県立静岡がんセンター

静岡県立静岡がんセンター　　2025年10月2日 改訂

消化器内科　　対象疾患：膵がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（2）	day（3）
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	持続点滴末梢	30分で	10:00		
	デキサート注射液 3.3mg/mL	2mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	10:30		
No.3	エルプラット点滴静注液	85mg/㎡	持続点滴末梢	2時間で	10:35		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.4	レボホリナート点滴静注用	200mg/㎡	持続点滴末梢（側管）	2時間で	12:35		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.5	イリノテカン塩酸塩点滴静注	150mg/㎡	持続点滴末梢	90分で	13:05		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.6	フルオロウラシル注	2400mg/㎡	持続点滴末梢	46時間で	14:35		
	生理食塩液	1000mL					
No.7	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で			化学療法終了時

インターバル日数：　14日

	商品名	標準値	上限値
No.3	エルプラット点滴静注液	85mg/㎡	85mg/㎡
No.4	レボホリナート点滴静注用	200mg/㎡	200mg/㎡
No.5	イリノテカン塩酸塩点滴静注	150mg/㎡	150mg/㎡
No.6	フルオロウラシル注	2400mg/㎡	2400mg/㎡

備考