

レジメン名 : CBDCA+VP-16療法

静岡県立静岡がんセンター

2022年1月31日 改訂

泌尿器科

対象疾患 : 前立腺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	持続点滴末梢	15分で	10:15		
	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL					
No.2	エトポシド点滴静注液	80mg/m ²	持続点滴末梢	90分で	10:30		
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.3	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	持続点滴末梢	90分で	12:00		
	生理食塩液	500mL					
No.4	ソルデム3A輸液	500mL	持続点滴末梢	90分で	13:30		
No.5	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で		10:15	10:15
	生理食塩液	50mL					
No.6	エトポシド点滴静注液	80mg/m ²	持続点滴末梢	90分で		10:30	10:30
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.7	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で		12:00	12:00
No.8	生理食塩液	50mL	バックプライミング		1回		

インターバル日数 : 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	エトポシド点滴静注液	80mg/m ²	80mg/m ²
No.3	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	750mg
No.6	エトポシド点滴静注液	80mg/m ²	80mg/m ²

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出