レジメン名：パクリタキセル＋ゲムシタビン療法

静岡県立静岡がんセンター

2022年12月7日 改訂

泌尿器科　　対象疾患：尿路上皮がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（8）	day（15）
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	6mL	持続点滴末梢	10分で	10:00		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	生理食塩液	50mL					
No.2	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL	持続点滴末梢	20分で	10:10	10:00	10:00
No.3	パクリタキセル注	180mg/㎡	持続点滴末梢	180分で	10:30		
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.4	ジェムザール注	1000mg/㎡	持続点滴末梢	30分で	13:30	10:20	10:20
	生理食塩液（一次溶解液）						
	ソルデム3A輸液	200mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	14:00	10:50	10:50

インターバル日数：28日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	パクリタキセル注	180mg/㎡	180mg/㎡
No.4	ジェムザール注	1000mg/㎡	1000mg/㎡

備考