

# レジメン名: TIP療法

静岡県立静岡がんセンター

2022年12月7日 改訂

泌尿器科

対象疾患: 精巣がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
No.1	メイロン7%	40mL	中心静脈	23時間で	11:00				
	生理食塩液	1000mL							
	ソルデム3A輸液	1000mL							
No.2	デキサート注射液3.3mg/mL	6mL	中心静脈(側管)	10分で	13:00				
	ファモチジン注射液20mg	20mg							
	ボラミン注5mg1mL	5mg							
	生理食塩液	50mL							
No.3	カイトリル点滴静注バッグ3.0mg100mL	100mL	中心静脈(側管)	20分で	13:10				
No.4	バクリタキセル注	250mg/m <sup>2</sup>	中心静脈(側管)	3時間で	13:30				
	生理食塩液	500mL							
No.5	メイロン7%	100mL	中心静脈	24時間で		10:00	10:00	10:00	10:00
	生理食塩液	1500mL							
	ソルデム3A輸液	1500mL							
No.6	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	中心静脈(側管)	30分で		10:00	10:00	10:00	10:00
	カイトリル点滴静注バッグ3.0mg100mL	100mL							
No.7	ウロミテキサン注	400mg	中心静脈(側管)	30分で		10:30	10:30	10:30	10:30
	生理食塩液	100mL							
No.8	注射用イホマイド	1.5g/m <sup>2</sup>	中心静脈(側管)	30分で		11:00	11:00	11:00	11:00
	生理食塩液(一次溶解液)								
	生理食塩液	100mL							
No.9	15%マンニトールS注射液	50mL	中心静脈	30分で		11:30	11:30	11:30	11:30
No.10	シスプラチン注	25mg/m <sup>2</sup>	中心静脈(側管)	1時間で		12:00	12:00	12:00	12:00
No.11	15%マンニトールS注射液	100mL	中心静脈(側管)	1時間で		13:00	13:00	13:00	13:00
No.12	ウロミテキサン注	400mg	中心静脈(側管)	30分で		14:00	14:00	14:00	14:00
	生理食塩液	100mL							
No.13	生理食塩液	1000mL	中心静脈(側管)	6.5時間で		14:30	14:30	14:30	14:30
No.14	ウロミテキサン注	400mg	中心静脈(側管)	30分で		19:00	19:00	19:00	19:00
	生理食塩液	100mL							
No.15	ソルデム3A輸液	1000mL	中心静脈(側管)	13時間で		21:00	21:00	21:00	21:00
No.16	生理食塩液	50mL	バックプライミング			1回	1回	1回	1回

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.4	バクリタキセル注	250mg/m <sup>2</sup>	250mg/m <sup>2</sup>
No.8	注射用イホマイド	1.5g/m <sup>2</sup>	1.5g/m <sup>2</sup>
No.10	シスプラチン注	25mg/m <sup>2</sup>	25mg/m <sup>2</sup>

備考