

レジメン名: 陰茎がんに対するTIP療法

静岡県立静岡がんセンター

2022年12月7日 改訂

泌尿器科

対象疾患: 陰茎がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
No.1	ホスアプレピタント点滴静注用	150mg	中心静脈(側管)	30分で	9:30				
	生理食塩液	250mL							
No.2	メイロン7%	100mL	中心静脈	24時間で	10:00	10:00	10:00	10:00	
	ハルトマンD液	1500mL							
	ソルデム3A輸液	1500mL							
No.3	デキサート注射液3.3mg/mL	6mL	中心静脈(側管)	15分で	10:00				
	ファモチジン注射液20mg	20mg							
	ポラミン注5mg1mL	5mg							
	グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL							
No.4	パクリタキセル注	175mg/m ²	中心静脈(側管)	3時間で	10:30				
	生理食塩液	500mL							
No.5	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	中心静脈(側管)	15分で		10:00			
	グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL							
No.6	デキサート注射液3.3mg/mL	4mL	中心静脈(側管)	15分で			10:00		
	グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL							
No.7	デキサート注射液3.3mg/mL	4mL	中心静脈(側管)	15分で				10:00	
	生理食塩液	50mL							
No.8	ウロミテキサン注	400mg	中心静脈(側管)	30分で	13:30	10:30	10:30		
	生理食塩液	100mL							
No.9	注射用イホマイド	1.2g/m ²	中心静脈(側管)	30分で	14:00	11:00	11:00		
	生理食塩液(一次溶解液)								
	生理食塩液	100mL							
No.10	15%マンニトールS注射液	50mL	中心静脈(側管)	30分で	14:30	11:30	11:30		
No.11	シスプラチン注	25mg/m ²	中心静脈(側管)	2時間で	15:00	12:00	12:00		
	生理食塩液	500mL							
No.12	15%マンニトールS注射液	100mL	中心静脈(側管)	1時間で	17:00	14:00	14:00		
No.13	ウロミテキサン注	400mg	中心静脈(側管)	30分で	18:00	15:00	15:00		
	生理食塩液	100mL							
No.14	生理食塩液	1000mL	中心静脈(側管)	3.5時間で	18:30	15:30	15:30		
No.15	ウロミテキサン注	400mg	中心静脈(側管)	30分で	22:00	19:00	19:00		
	生理食塩液	100mL							
No.16	ソルデム3A輸液	1000mL	中心静脈(側管)	11.5時間で	22:30				
No.17	ソルデム3A輸液	1000mL	中心静脈(側管)	14.5時間で		19:30	19:30		
No.18	生理食塩液	50mL	バックプライミング		1回	1回	1回		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.4	パクリタキセル注	175mg/m ²	175mg/m ²
No.9	注射用イホマイド	1.2g/m ²	1.2g/m ²
No.11	シスプラチン注	25mg/m ²	25mg/m ²

備考