レジメン名：Pembrolizumab＋PTX＋CBDCA療法

静岡県立静岡がんセンター

2024年11月14日 改訂

乳腺外科　　対象疾患：乳がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（8）	day（15）
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		9:30		
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	持続点滴末梢	30分で	9:30		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	10:00		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	10:05	10:00	10:00
	ポララミン注5mg1mL	1mL					
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg50mL	50mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	15分で	10:20	10:15	10:15
No.6	パクリタキセル注	80mg/㎡	持続点滴末梢	60分で	10:35	10:30	10:30
	生理食塩液	250mL					
No.7	カルボプラチン点滴静注液	AUC1.5	持続点滴末梢	60分で	11:35	11:30	11:30
	生理食塩液	250mL					
No.8	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:35	12:30	12:30

インターバル日数：21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	200mg
No.6	パクリタキセル注	80mg/㎡	80mg/㎡
No.7	カルボプラチン点滴静注液	AUC1.5	225mg/body

備考
Cockcroftの式を用いてCCrを算出