

レジメン名 : Pembrolizumab + EC療法

静岡県立静岡がんセンター

2022年10月27日 改訂

乳腺外科

対象疾患:乳がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	持続点滴末梢	30分で	10:00		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	10:30		
No.4	デキサート3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	10:35		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 50mL	50mL					
No.5	エピルビシン塩酸塩注射用	90mg/m ²	持続点滴末梢	15分で	10:50		
	注射用水(一次溶解液)						
	生理食塩液	100mL					
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:05		
No.7	注射用エンドキサン	600mg/m ²	持続点滴末梢	30分で	11:10		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	250mL					
No.8	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:40		

インターバル日数 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	200mg
No.5	エピルビシン塩酸塩注射用	90mg/m ²	90mg/m ²
No.7	注射用エンドキサン	600mg/m ²	600mg/m ²

備考
アプレピタント内服