

レジメン名:XP+HER療法(2回目以降)

静岡県立静岡がんセンター
2022年10月3日 改訂

消化器内科

対象疾患:胃がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)
No.1	ソルデム3AG輸液	1000mL	持続点滴末梢	24時間で	9:00			
	ラクテック注	500mL						
No.2	硫酸Mg補正液20mEq/20mL	20mL	点滴末梢(側管)	2時間で	9:00			
	ラクテック注	500mL						
No.3	トラスツズマブBS点滴静注用	6mg/kg	点滴末梢(側管)	30分で	11:00			
	生理食塩液	250mL						
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	点滴末梢(側管)	15分で	11:30			
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL						
No.5	シスプラチン注	80mg/m ²	点滴末梢(側管)	2時間で	11:45			
	生理食塩液	300mL						
No.6	生理食塩液	1000mL	点滴末梢(側管)	5時間で	13:45			
No.7	ソルデム3AG輸液	1000mL	持続点滴末梢	24時間で		9:00	9:00	
	ラクテック注	1000mL						
No.8	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢(側管)	15分で		9:00	9:00	9:00
	生理食塩液	50mL						
No.9	生理食塩液	1000mL	点滴末梢(側管)	5時間で		9:15	9:15	

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	トラスツズマブBS点滴静注用	6mg/kg	6mg/kg
No.5	シスプラチン注	80mg/m ²	80mg/m ²

備考
ゼローダ 2000mg/m ² /日、分2(朝、夕食後) 2週間内服 1週間休薬 アプレピタント内服