レジメン名：SP療法

静岡県立静岡がんセンター
2026年3月23日 改訂

消化器内科　　対象疾患：胃がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（8）	day（9）	day（10）	day（11）
No.1	ラクテック注	500mL	持続点滴末梢	24時間で	10:30	10:30	10:30	
No.2	硫酸Mg補正液20mEq/20mL	20mL	点滴末梢（側管）	2時間で	10:30			
	ラクテック注	500mL						
No.3	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	点滴末梢（側管）	15分で	12:30			
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL						
No.4	シスプラチン注	60mg/㎡	点滴末梢（側管）	2時間で	12:45			
	生理食塩液	400mL						
No.5	ソルデム3AG輸液	500mL	点滴末梢（側管）	2時間で	14:45			
No.6	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢（側管）	15分で		10:30	10:30	10:30
	生理食塩液	50mL						
No.7	ラクテック注	500mL	点滴末梢（側管）	2.5時間で		10:45	10:45	

インターバル日数：　35日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.4	シスプラチン注	60mg/㎡	60mg/㎡

備考
ティーエスワン　80mg/㎡/日、分2（朝、夕食後） 3週間内服　2週間休薬 アプレピタント内服