レジメン名：XP療法

静岡県立静岡がんセンター
2022年10月3日 改訂

消化器内科　　対象疾患：胃がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（2）	day（3）	day（4）
No.1	ソルデム3AG輸液	500mL	持続点滴末梢	24時間で	9:00			
	ラクテック注	1000mL						
No.2	硫酸Mg補正液20mEq/20mL	20mL	点滴末梢（側管）	2時間で	9:00			
	ラクテック注	500mL						
No.3	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	点滴末梢（側管）	15分で	11:00			
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL						
No.4	シスプラチン注	80mg/㎡	点滴末梢（側管）	2時間で	11:15			
	生理食塩液	300mL						
No.5	グルアセト35注	1000mL	点滴末梢（側管）	5時間で	13:15			
No.6	ソルデム3AG輸液	1000mL	持続点滴末梢	24時間で		9:00	9:00	
	ラクテック注	1000mL						
No.7	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢（側管）	15分で		9:00	9:00	9:00
	生理食塩液	50mL						
No.8	グルアセト35注	1000mL	点滴末梢（側管）	5時間で		9:15	9:15	

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.4	シスプラチン注	80mg/㎡	80mg/㎡

備考
ゼローダ　2000mg/㎡/日、分2（朝、夕食後） 2週間内服　1週間休薬 アプレピタント内服