

レジメン名：(婦人)BEP療法

2022年2月3日 改訂

婦人科

対象疾患:胚細胞腫瘍

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(9)	day(16)
No.1	フィジオ140輸液	500mL	持続点滴末梢	1時間で	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00		
No.2	デキサート注射液3.3mg/mL グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	3mL 50mL	点滴末梢(側管)	15分で	9:45	9:45	9:45	9:45	9:45		
No.3	エトポシド点滴静注液 5%ブドウ糖液	100mg/m ² 500mL	持続点滴末梢	2時間で	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
No.4	フィジオ140輸液	500mL	持続点滴末梢	1時間で	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00		
No.5	シスプラチン注 生理食塩液	20mg/m ² 500mL	持続点滴末梢	1時間で	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00		
No.6	15%マンニトールS注射液	100mL	持続点滴末梢	1時間で	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00		
No.7	フィジオ140輸液 ソルデム3A輸液	500mL 1000mL	持続点滴末梢	4.5時間で	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00		
No.8	ブレオ注射用 生理食塩液(一次溶解液) 生理食塩液	20mg/m ² 50mL	点滴末梢(側管)	30分で		15:30				10:00	10:00
No.9	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で						10:30	10:30
No.10	生理食塩液	50mL	バックプライミング		1回	1回	1回	1回	1回		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	100mg/m ²
No.5	シスプラチン注	20mg/m ²	20mg/m ²
No.8	ブレオ注射用	20mg/m ²	30mg

備考