

レジメン名 : Ifosfamide療法

静岡県立静岡がんセンター

2022年2月3日 改訂

婦人科

対象疾患 : 子宮肉腫

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
No.1	ソルデム3A輸液	200mL	持続点滴末梢	1時間で	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
No.2	デキサート注射液3.3mg/mL グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	2mL 50mL	点滴末梢(側管)	15分で	9:45	9:45	9:45	9:45	9:45
No.3	注射用イホマイド [®] 生理食塩液(一次溶解液) 生理食塩液	1.5g/m ² 500mL	点滴末梢(側管)	2時間で	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
No.4	ウロミテキサン注 生理食塩液	300mg 100mL	点滴末梢(側管)	30分で	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
No.5	ソルデム3A輸液 メイロン7% ラクテック注	500mL 40mL 500mL	持続点滴末梢	6時間で	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
No.6	ウロミテキサン注 生理食塩液	300mg 100mL	点滴末梢(側管)	30分で	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00
No.7	ソルデム3A輸液 ラクテック注	500mL 500mL	持続点滴末梢	15時間で	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00
No.8	ウロミテキサン注 生理食塩液	300mg 100mL	点滴末梢(側管)	30分で	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00
No.9	生理食塩液	50mL	バックプライミング		1回	1回	1回	1回	1回

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	注射用イホマイド [®]	1.5g/m ²	1.5g/m ²

備考