

# レジメン名: IP療法

静岡県立静岡がんセンター

2022年2月3日 改訂

婦人科

対象疾患: 子宮肉腫

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day( )
No.1	ラクテック注	500mL	持続点滴末梢	2時間で	9:00	9:00	9:00	9:00	
No.2	デキサート注射液3.3mg/mL グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	2mL 50mL	点滴末梢(側管)	15分で	10:15	10:15	10:15	10:15	
No.3	シスプラチン注 生理食塩液	20mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴末梢(側管)	2時間で	11:00	11:00	11:00	11:00	
No.4	15%マンニトールS注射液	300mL	持続点滴末梢	1時間で	13:00	13:00	13:00	13:00	
No.5	注射用イホマイド 生理食塩液(一次溶解液) 生理食塩液	1.5g/m <sup>2</sup> 500mL	点滴末梢(側管)	2時間で	14:00	14:00	14:00	14:00	
No.6	ウロミテキサン注 生理食塩液	300mg 100mL	点滴末梢(側管)	30分で	14:00	14:00	14:00	14:00	
No.7	ソルデム3A輸液 メイロン7% ラクテック注	1000mL 60mL 500mL	持続点滴末梢	8時間で	16:00	16:00	16:00	16:00	
No.8	ウロミテキサン注 生理食塩液	300mg 100mL	点滴末梢(側管)	30分で	18:00	18:00	18:00	18:00	
No.9	ウロミテキサン注 生理食塩液	300mg 100mL	点滴末梢(側管)	30分で	22:00	22:00	22:00	22:00	
No.10	生理食塩液	50mL	バックプライミング		1回	1回	1回	1回	

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	シスプラチン注	20mg/m <sup>2</sup>	20mg/m <sup>2</sup>
No.5	注射用イホマイド	1.5g/m <sup>2</sup>	1.5g/m <sup>2</sup>

備考