

レジメン名: TC+アバスチン療法

静岡県立静岡がんセンター

2024年12月3日 改訂

婦人科

対象疾患: 卵巣がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	6mL	持続点滴末梢	15分で	10:00		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	15分で	10:15		
No.3	パクリタキセル注	180mg/m ²	持続点滴末梢	180分で	10:30		
	生理食塩液	500mL					
No.4	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	持続点滴末梢	1時間で	13:30		
	生理食塩液	250mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	14:30		
No.6	ベバシズマブBS点滴静注	15mg/kg	持続点滴末梢	90分で	14:35		
	生理食塩液	100mL		2回目60分で			
				3回目以降30分で			
No.7	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	10分で	16:05		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	パクリタキセル注	180mg/m ²	180mg/m ²
No.4	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	900mg/body
No.6	ベバシズマブBS点滴静注	15mg/kg	15mg/kg

備考
Jelliffeの式を用いてCCrを算出