

# レジメン名: TP+Bv療法

静岡県立静岡がんセンター

2024年12月3日 改訂

婦人科

対象疾患: 子宮頸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	6mL	持続点滴末梢	15分で	9:00		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	生理食塩液	50mL					
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	15分で	9:15		
No.3	パクリタキセル注	67.5mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	12時間	9:30		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.4	パクリタキセル注	67.5mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	12時間	21:30		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.5	フィジオ140輸液	1000mL	持続点滴末梢	2.5時間で		9:30	
No.6	フィジオ140輸液	500mL	持続点滴末梢	1時間で		12:00	
	硫酸マグネシウム補正液20mEq/20mL	8mL					
No.7	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	持続点滴末梢	15分で		13:00	
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.8	シスプラチン注	50mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	2時間で		13:15	
	生理食塩液	400mL					
No.9	ラシックス注20mg/2mL	10mg	ワンショット末梢			15:15	
No.10	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で		15:15	
No.11	アバステン点滴静注用	15mg/kg	持続点滴末梢	90分で		15:20	
	生理食塩液	100mL		2回目60分で			
				3回目以降30分で			
No.12	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で		16:50	
No.13	フィジオ140輸液	1500mL	持続点滴末梢	4.5時間で		16:55	
No.14	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で			9:00
	生理食塩液	50mL					
No.15	フィジオ140輸液	1000mL	持続点滴末梢	10時間で			9:15
	ソルデム3A輸液	1000mL					

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	パクリタキセル注	67.5mg/m <sup>2</sup>	67.5mg/m <sup>2</sup>
No.4	パクリタキセル注	67.5mg/m <sup>2</sup>	67.5mg/m <sup>2</sup>
No.8	シスプラチン注	50mg/m <sup>2</sup>	50mg/m <sup>2</sup>
No.11	アバステン点滴静注用	15mg/kg	15mg/kg

備考
アプレピタント内服