

レジメン名 : TC + Pem療法

静岡県立静岡がんセンター

2022年10月19日 改訂

婦人科

対象疾患 : 子宮頸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200mg 100mL	持続点滴末梢	30分で	10:00		
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	10分で	10:30		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL ファモチジン注射液20mg ポララミン注5mg1mL アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	6mL 20mg 5mg 50mL	持続点滴末梢	15分で	10:40		
No.5	生理食塩液	100mL	持続点滴末梢	15分で	10:55		
No.6	パクリタキセル注 生理食塩液	175mg/m ² 500mL	持続点滴末梢	3時間で	11:10		
No.7	カルボプラチン点滴静注液 生理食塩液	AUC5 250mL	持続点滴末梢	1時間で	14:10		
No.8	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	10分で	15:10		

インターバル日数 : 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	200mg
No.6	パクリタキセル注	175mg/m ²	175mg/m ²
No.7	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	900mg/body

備考
Jelliffeの式を用いてCCrを算出