

# レジメン名 : TP + Pem療法

静岡県立静岡がんセンター

2023年3月2日 改訂

婦人科

対象疾患:子宮頸がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day( )
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		9:00		
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	持続点滴末梢	30分で	9:00		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	10分で	9:30		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	6mL	持続点滴末梢	30分で	9:40		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.5	生理食塩液	100mL	持続点滴末梢	15分で	10:10		
No.6	パクリタキセル注	175mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	3時間で	10:25		
	生理食塩液	500mL					
No.7	生理食塩液	500mL	持続点滴末梢	1時間で	13:25		
	硫酸マグネシウム補正液20mEq/20mL	8mL					
No.8	シスプラチン注	50mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	1時間で	14:25		
	生理食塩液	全量250mL					
No.9	ラシックス注20mg/2mL	10mg	ワンショット末梢		15:25		
No.10	フィジオ140輸液	1500mL	持続点滴末梢	4.5時間で	15:25		
	生理食塩液	250mL					
No.11	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	10分で		9:00	
	生理食塩液	50mL					
No.12	フィジオ140輸液	1000mL	持続点滴末梢	10時間で		9:10	
	ソルデム3A輸液	1000mL					

インターバル日数:21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	200mg
No.6	パクリタキセル注	175mg/m <sup>2</sup>	175mg/m <sup>2</sup>
No.8	シスプラチン注	50mg/m <sup>2</sup>	50mg/m <sup>2</sup>

備考
アブレピタント内服