

レジメン名 : (POSEIDON) PEM+D+T維持療法(1、2コース目)

静岡県立静岡がんセンター
2023年4月11日 改訂

呼吸器内科

対象疾患: 非小細胞肺癌

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00	10:00	
No.2	イジユド点滴静注	75mg	持続点滴末梢	1時間で		10:00	
	生理食塩液	50mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で		11:00	
No.4	イミフィンジ点滴静注	1500mg	持続点滴末梢	1時間で	10:00	11:05	
	生理食塩液	250mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:00	12:05	
No.6	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	11:05	12:10	
	生理食塩液	50mL					
No.7	アリムタ注射用	500mg/m ²	持続点滴末梢	360mL/h	11:20	12:25	
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	30mL					
No.8	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:30	12:35	

インターバル日数: 56日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	イジユド点滴静注	75mg	75mg
No.4	イミフィンジ点滴静注	1500mg	1500mg
No.7	アリムタ注射用	500mg/m ²	500mg/m ²

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 初回投与7日以上前より 葉酸(パンピタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎