

# レジメン名 : (POSEIDON) PEM+D維持療法 (3コース目以降)

静岡県立静岡がんセンター  
2023年4月11日 改訂

呼吸器内科

対象疾患: 非小細胞肺癌

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day( )	day( )
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	イミフィンジ点滴静注	1500mg	持続点滴末梢	1時間で	10:00		
	生理食塩液	250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:00		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で	11:05		
	生理食塩液	50mL					
No.5	アリムタ注射用	500mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	360mL/h	11:20		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	30mL					
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:30		

インターバル日数: 28日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	イミフィンジ点滴静注	1500mg	1500mg
No.5	アリムタ注射用	500mg/m <sup>2</sup>	500mg/m <sup>2</sup>

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 初回投与7日以上前より 葉酸(パンピタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎