レジメン名：（CM816）CBDCA＋PTX＋Nivo療法

静岡県立静岡がんセンター
2024年12月5日 改訂

呼吸器内科　　対象疾患：非小細胞肺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	オプジーボ点滴静注	360mg	持続点滴末梢	30分で	10:00		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	10:30		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	6mL	持続点滴末梢	30分で	10:35		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	15分で	11:05		
No.6	パクリタキセル注	200mg/㎡	持続点滴末梢	3時間で	11:20		
	生理食塩液	500mL					
No.7	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	持続点滴末梢	60分で	14:20		
	生理食塩液	250mL					
No.8	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	15:20		

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	オプジーボ点滴静注	360mg	360mg
No.6	パクリタキセル注	200mg/㎡	200mg/㎡
No.7	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	900mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出