

# レジメン名:カルボプラチン+ゲムシタビン療法

静岡県立静岡がんセンター

2023年7月14日 改訂

泌尿器科

対象疾患:膀胱がん、腎盂尿管がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day( )
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	1mL	持続点滴末梢	30分で	10:00		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.2	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	持続点滴末梢	90分で	10:30		
	生理食塩液	500mL					
No.3	ジェムザール注	1000mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	30分で	12:00		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	ソルデム3A輸液	200mL					
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で		10:00	
	生理食塩液	50mL					
No.5	ジェムザール注	1000mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	30分で		10:15	
	生理食塩液(一次溶解液)						
	ソルデム3A輸液	200mL					
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:30	10:45	

インターバル日数:21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	750mg/body
No.3	ジェムザール注	1000mg/m <sup>2</sup>	1000mg/m <sup>2</sup>
No.5	ジェムザール注	1000mg/m <sup>2</sup>	1000mg/m <sup>2</sup>

備考
Cockcroft-Gaultの式を用いてCCrを算出