

# レジメン名: FLONTALE NIVO+FOLFOX(中心静脈)療法

静岡県立静岡がんセンター

2024年3月21日 改訂

消化器内科

対象疾患: 食道がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day( )	day( )
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		9:50		
No.2	オブジーボ点滴静注	240mg	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	30分で	9:50		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	10分で	10:20		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	15分で	10:30		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.5	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	10:45		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.6	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	中心静脈(側管)	2時間で	10:45		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.7	フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	5分で	12:45		
	5%ブドウ糖液	50mL					
No.8	フルオロウラシル注	2400mg/m <sup>2</sup>	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	46時間で	12:50		
	生理食塩液	全量140mL	東レ トレフューサーポンプ(3.7mL/h)使用				
No.9	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈			化学療法終了時	

インターバル日数: 14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	オブジーボ点滴静注	240mg	240mg
No.5	エルプラット点滴静注液	85mg/m <sup>2</sup>	85mg/m <sup>2</sup>
No.6	レボホリナート点滴静注用	200mg/m <sup>2</sup>	200mg/m <sup>2</sup>
No.7	フルオロウラシル注	400mg/m <sup>2</sup>	400mg/m <sup>2</sup>
No.8	フルオロウラシル注	2400mg/m <sup>2</sup>	2400mg/m <sup>2</sup>

備考