

レジメン名: FLONTALE NIVO+FOLFOX(末梢)療法

静岡県立静岡がんセンター

2024年3月21日 改訂

消化器内科

対象疾患: 食道がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		9:50		
No.2	オブジーボ点滴静注 生理食塩液	240mg 100mL	点滴末梢	30分で	9:50		
No.3	生理食塩液	50mL	点滴末梢	10分で	10:20		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	2mL 50mL	点滴末梢	15分で	10:30		
No.5	エルプラット点滴静注液 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間で	10:45		
No.6	レボホリナート点滴静注用 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	点滴末梢	2時間で	10:45		
No.7	フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液	400mg/m ² 50mL	点滴末梢	5分で	12:45		
No.8	フルオロウラシル注 ソルデム3AG輸液 ラクテックG輸液	2400mg/m ² 500mL 1000mL	点滴末梢	46時間で	12:50		
No.9	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で			化学療法終了時

インターバル日数: 14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	オブジーボ点滴静注	240mg	240mg
No.5	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	85mg/m ²
No.6	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	200mg/m ²
No.7	フルオロウラシル注	400mg/m ²	400mg/m ²
No.8	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	2400mg/m ²

備考