

レジメン名: (CASPIAN: 高齢者) CBDCA+ETP+Durva療法

静岡県立静岡がんセンター
2024年5月30日 改訂

呼吸器内科

対象疾患: 小細胞肺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	イミフィンジ点滴静注	1500mg	持続点滴末梢	1時間で	10:00		
	生理食塩液	250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:00		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	1mL	持続点滴末梢	30分で	11:05		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL	50mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.5	エトポシド点滴静注液	80mg/m ²	持続点滴末梢	90分で	11:35		
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.6	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	持続点滴末梢	60分で	13:05		
	生理食塩液	250mL					
No.7	ソルデム3A輸液	500mL	持続点滴末梢	90分で	14:05		
No.8	生理食塩液	50mL	プライミング			10:00	10:00
No.9	エトポシド点滴静注液	80mg/m ²	持続点滴末梢	90分で		10:00	10:00
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.10	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で		11:30	11:30

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	イミフィンジ点滴静注	1500mg	1500mg
No.5	エトポシド点滴静注液	80mg/m ²	80mg/m ²
No.6	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	750mg
No.9	エトポシド点滴静注液	80mg/m ²	80mg/m ²

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出