

レジメン名 : Pembrolizumab + GEM療法

静岡県立静岡がんセンター
2025年6月5日 改訂

消化器内科

対象疾患:胆道がん

| 通しNo | 商品名・規格 | 投与量 | 手技・投与ルート | 点滴時間・速度 | day(1) | day(8) | day() |
|------|------------------------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|
| No.1 | 生理食塩液 | 50mL | プライミング | | 10:30 | | |
| | | | | | | | |
| No.2 | キイトルーダ点滴静注 | 200mg | 点滴末梢 | 30分で | 10:30 | | |
| | 生理食塩液 | 100mL | | | | | |
| No.3 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴末梢 | 5分で | 11:00 | | |
| | | | | | | | |
| No.4 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 50mL | 点滴末梢 | 15分で | 11:05 | 11:05 | |
| | | | | | | | |
| No.5 | ゲムシタビン点滴静注用 | 1000mg/㎡ | 点滴末梢 | 30分で | 11:20 | 11:20 | |
| | 生理食塩液(一次溶解液) | | | | | | |
| | ソルデム3A輸液 | 200mL | | | | | |
| No.6 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴末梢 | 5分で | 11:50 | 11:50 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

インターバル日数: 21日

| 通しNo | 商品名 | 標準値 | 上限値 |
|------|-------------|----------|----------|
| No.2 | キイトルーダ点滴静注 | 200mg | 200mg |
| No.5 | ゲムシタビン点滴静注用 | 1000mg/㎡ | 1000mg/㎡ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 備考 |
|----|
| |
| |
| |
| |
| |
| |