レジメン名：FOLFOX+ Zolbetuximab療法（初回）

静岡県立静岡がんセンター

2025年12月17日 改訂

消化器内科　　対象疾患：胃がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	30分で	10:00		
	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.2	生理食塩液	50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	5分で	10:30		
No.3	ビロイ点滴静注用	800mg/㎡	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	75mL/hr	10:35		
	注射用水（一次溶解液）			～最大225mL/hr			
	生理食塩液	400mL					
No.4	生理食塩液	50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	5分で	12:35		
No.5	エルプラット点滴静注液	85mg/㎡	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	12:40		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.6	レボホリナート点滴静注用	200mg/㎡	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	12:40		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.7	フルオロウラシル注	400mg/㎡	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	5分で	14:40		
	5%ブドウ糖液	50mL					
No.8	フルオロウラシル注	2400mg/㎡	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	46時間で	14:45		
	生理食塩液	全量140mL	東レ トレフューザーポンプ(3.7mL/h)使用				
No.9	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		化学療法終了時		

インターバル日数：　14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	ビロイ点滴静注用	800mg/㎡	800mg/㎡
No.5	エルプラット点滴静注液	85mg/㎡	85mg/㎡
No.6	レボホリナート点滴静注用	200mg/㎡	300mg/㎡
No.7	フルオロウラシル注	400mg/㎡	400mg/㎡
No.8	フルオロウラシル注	2400mg/㎡	2400mg/㎡

備考