

レジメン名 : FOLFOX+ Zolbetuximab療法 (初回)

静岡県立静岡がんセンター

2024年7月16日 改訂

消化器内科

対象疾患: 胃がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	30分で	10:00		
	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL					
	ポラミン注5mg1mL	5mg					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.2	生理食塩液	50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	5分で	10:30		
No.3	ピロイ点滴静注用 注射用水(一次溶解液)	800mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	100mg/m ² /hr ~最大400mg/m ² /hr	10:35		
	生理食塩液	500mLまたは1000mL					
No.4	生理食塩液	50mL	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	5分で	12:35		
No.5	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	12:40		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.6	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	2時間で	12:40		
	5%ブドウ糖液	250mL					
No.7	フルオロウラシル注	400mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	5分で	14:40		
	5%ブドウ糖液	50mL					
No.8	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	中心静脈・埋込・高カロリー輸液なし	46時間で	14:45		
	生理食塩液	全量140mL	東レ トレフューザーポンプ(3.7mL/h)使用				
No.9	ヘパリンNaロック用シリンジ1000U/10mL	10mL	ワンショット中心静脈		化学療法終了時		

インターバル日数: 14日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	ピロイ点滴静注用	800mg/m ²	800mg/m ²
No.5	エルプラット点滴静注液	85mg/m ²	85mg/m ²
No.6	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²	300mg/m ²
No.7	フルオロウラシル注	400mg/m ²	400mg/m ²
No.8	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	2400mg/m ²

備考