

レジメン名 : XELOX/SOX+Zolbetuximab療法(2回目以降)

静岡県立静岡がんセンター

2024年7月16日 改訂

消化器内科

対象疾患: 胃がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	持続点滴末梢	30分で	10:00		
	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL					
	ボラミン注5mg1mL	5mg					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	10:30		
No.3	ピロイ点滴静注用	600mg/m ²	持続点滴末梢	75mg/m ² /hr	10:35		
	注射用水(一次溶解液)			~最大300mg/m ² /hr			
	生理食塩液	500mL					
No.4	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:35		
No.5	エルプラット点滴静注液	130mg/m ²	持続点滴末梢	2時間で	12:40		
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.6	5%ブドウ糖液	50mL	持続点滴末梢	5分で	14:40		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	ピロイ点滴静注用	600mg/m ²	600mg/m ²
No.5	エルプラット点滴静注液	130mg/m ²	130mg/m ²

備考
XELOX+Zolbetuximab ゼローダ 2000mg/m ² /日、分2(朝、夕食後) 2週間内服 1週間休薬
SOX+Zolbetuximab ティーエスワン 80mg/m ² /日、分2(朝、夕食後) 2週間内服 1週間休薬