レジメン名：XELOX/SOX+Zolbetuximab療法（2回目以降）

静岡県立静岡がんセンター

2025年12月17日 改訂

消化器内科　　対象疾患：胃がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL	持続点滴末梢	30分で	10:00		
	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.2	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	10:30		
No.3	ビロイ点滴静注用	600mg/㎡	持続点滴末梢	75mL/hr	10:35		
	注射用水（一次溶解液）			～最大225mL/hr			
	生理食塩液	300mL					
No.4	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:35		
No.5	エルプラット点滴静注液	130mg/㎡	持続点滴末梢	2時間で	12:40		
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.6	5%ブドウ糖液	50mL	持続点滴末梢	5分で	14:40		

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.3	ビロイ点滴静注用	600mg/㎡	600mg/㎡
No.5	エルプラット点滴静注液	130mg/㎡	130mg/㎡

備考
XELOX+Zolbetuximab
ゼローダ　2000mg/㎡/日、分2（朝、夕食後）
2週間内服　1週間休薬
SOX+Zolbetuximab
ティーエスワン　80mg/㎡/日、分2（朝、夕食後）
2週間内服　1週間休薬