

レジメン名 : カル＋ペメ＋Ami療法 (2c1d、80kg未満)

静岡県立静岡がんセンター

2024年11月19日 改訂

呼吸器内科

対象疾患: 非小細胞肺癌

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	持続点滴末梢	30分で	10:00			
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL						
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL						
No.2	ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	持続点滴末梢	360mL/h	10:30			
	生理食塩液	30mL						
No.3	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	持続点滴末梢	1時間で	10:35			
	生理食塩液	250mL						
No.4	ファモチジン注射液20mg	20mg	持続点滴末梢	15分で	11:35			
	ポラミン注5mg1mL	5mg						
	アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ	100mL						
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:50			
No.6	ライブリバント点滴静注	1400mg	持続点滴末梢	2時間で	11:55			
	生理食塩液	全量250mL						
No.7	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	13:55			

インターバル日数： 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	500mg/m ²
No.3	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	750mg
No.6	ライブリバント点滴静注	1400mg	1400mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 初回投与7日以上前より 葉酸 (パンビタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎