

レジメン名 : カル＋ペメ＋Ami療法 (3-4c 1d、80kg未満)

静岡県立静岡がんセンター

2024年11月19日 改訂

呼吸器内科

対象疾患: 非小細胞肺癌

| 通しNo | 商品名・規格                 | 投与量                  | 手技・投与ルート | 点滴時間・速度 | day(1) | day( ) | day( ) | day( ) |
|------|------------------------|----------------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| No.1 | デキサート注射液3.3mg/mL       | 3mL                  | 持続点滴末梢   | 30分で    | 10:00  |        |        |        |
|      | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL  | 50mL                 |          |         |        |        |        |        |
|      | アロカリス点滴静注235mg10mL     | 10mL                 |          |         |        |        |        |        |
| No.2 | ペメトレキセド点滴静注液           | 500mg/m <sup>2</sup> | 持続点滴末梢   | 360mL/h | 10:30  |        |        |        |
|      | 生理食塩液                  | 30mL                 |          |         |        |        |        |        |
| No.3 | カルボプラチン点滴静注液           | AUC5                 | 持続点滴末梢   | 1時間で    | 10:35  |        |        |        |
|      | 生理食塩液                  | 250mL                |          |         |        |        |        |        |
| No.4 | ファモチジン注射液20mg          | 20mg                 | 持続点滴末梢   | 15分で    | 11:35  |        |        |        |
|      | ポラミン注5mg1mL            | 5mg                  |          |         |        |        |        |        |
|      | アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ | 100mL                |          |         |        |        |        |        |
| No.5 | 生理食塩液                  | 50mL                 | 持続点滴末梢   | 5分で     | 11:50  |        |        |        |
|      |                        |                      |          |         |        |        |        |        |
| No.6 | ライブリバント点滴静注            | 1750mg               | 持続点滴末梢   | 2時間で    | 11:55  |        |        |        |
|      | 生理食塩液                  | 全量250mL              |          |         |        |        |        |        |
| No.7 | 生理食塩液                  | 50mL                 | 持続点滴末梢   | 5分で     | 13:55  |        |        |        |
|      |                        |                      |          |         |        |        |        |        |
|      |                        |                      |          |         |        |        |        |        |
|      |                        |                      |          |         |        |        |        |        |

インターバル日数： 21日

| 通しNo | 商品名          | 標準値                  | 上限値                  |
|------|--------------|----------------------|----------------------|
| No.2 | ペメトレキセド点滴静注液 | 500mg/m <sup>2</sup> | 500mg/m <sup>2</sup> |
| No.3 | カルボプラチン点滴静注液 | AUC5                 | 750mg                |
| No.6 | ライブリバント点滴静注  | 1750mg               | 1750mg               |
|      |              |                      |                      |
|      |              |                      |                      |
|      |              |                      |                      |

| 備考                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出<br>初回投与7日以上前より<br>葉酸 (パンビタン末 1g) 1日1回 連日内服<br>ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎 |