

レジメン名:カル+ペメ+Ami療法(5c以降 d1、80kg以上)

静岡県立静岡がんセンター

2025年3月28日 改訂

呼吸器内科

対象疾患:非小細胞肺癌

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	10分で	10:00			
	生理食塩液	50mL						
No.2	アリムタ注射用	500mg/m ²	持続点滴末梢	360mL/h	10:10			
	生理食塩液(一次溶解液)							
	生理食塩液	30mL						
No.3	ファモチジン注射液20mg	20mg	持続点滴末梢	15分で	10:15			
	ポララミン注5mg1mL	5mg						
	アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ	100mL						
No.4	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	10:30			
No.5	ライブリバント点滴静注	2100mg	持続点滴末梢	2時間で	10:35			
	生理食塩液	全量250mL						
No.6	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:35			

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	アリムタ注射用	500mg/m ²	500mg/m ²
No.5	ライブリバント点滴静注	2100mg	2100mg

備考
初回投与7日以上前より 葉酸(パンビタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎