

レジメン名:カル+ペメ+Ami療法(1c、80kg以上)

静岡県立静岡がんセンター

2024年11月19日 改訂

呼吸器内科

対象疾患:非小細胞肺癌

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(8)	day(15)
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	持続点滴末梢	30分で	10:00			
	アロキシン点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL						
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL						
No.2	ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	持続点滴末梢	360mL/h	10:30			
	生理食塩液	30mL						
No.3	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	持続点滴末梢	1時間で	10:35			
	生理食塩液	250mL						
No.4	ファモチジン注射液20mg	20mg	持続点滴末梢	15分で	11:35			
	ボラミン注5mg1mL	5mg						
	アセリオ静注液1000mg/100mL/バッグ	100mL						
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:50			
No.6	ライブリバント点滴静注	350mg	持続点滴末梢	50mL/h	11:55			
	生理食塩液	全量250mL		~75mL/h				
No.7	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	15:55			
No.8	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	持続点滴末梢	15分で		10:00		
	ファモチジン注射液20mg	20mg						
	ボラミン注5mg1mL	5mg						
	アセリオ静注液1000mg/100mL/バッグ	100mL						
No.9	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で		10:15		
No.10	ライブリバント点滴静注	1400mg	持続点滴末梢	25mL/h		10:20		
	生理食塩液	全量250mL		~50mL/h				
No.11	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で		16:20		
No.12	ファモチジン注射液20mg	20mg	持続点滴末梢	15分で			10:00	10:00
	ボラミン注5mg1mL	5mg						
	アセリオ静注液1000mg/100mL/バッグ	100mL						
No.13	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で			10:15	10:15
No.14	ライブリバント点滴静注	1750mg	持続点滴末梢	65mL/h			10:20	
	生理食塩液	全量250mL						
No.15	ライブリバント点滴静注	1750mg	持続点滴末梢	85mL/h				10:20
	生理食塩液	全量250mL						
No.16	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で			14:20	13:20

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	ペメトレキセド点滴静注液	500mg/m ²	500mg/m ²
No.3	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	750mg
No.6	ライブリバント点滴静注	350mg	350mg
No.10	ライブリバント点滴静注	1400mg	1400mg
No.14	ライブリバント点滴静注	1750mg	1750mg
No.15	ライブリバント点滴静注	1750mg	1750mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 初回投与7日以上前より 葉酸(パンビタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎