

レジメン名 : weekly CDDP+Pem療法 (A-18)

静岡県立静岡がんセンター
2025年2月4日 改訂

婦人科		対象疾患:子宮頸がん								
通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		9:25					
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	持続点滴末梢	30分で	9:25					
	生理食塩液	100mL								
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	9:55					
No.4	フィジオ140輸液	1000mL	持続点滴末梢	3時間で	10:00		10:00		10:00	
	硫酸マグネシウム補正液20mEq/20mL	8mL								
No.5	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	点滴末梢(側管)	15分で	12:45		12:45		12:45	
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL								
No.6	シスプラチン注	40mg/m ²	持続点滴末梢	2時間で	13:00		13:00		13:00	
	生理食塩液	250mL								
No.7	15%マンニトールS注射液	300mL	持続点滴末梢	1時間で	15:00		15:00		15:00	
No.8	フィジオ140輸液	1500mL	持続点滴末梢	6時間で	16:00		16:00		16:00	
No.9	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で		9:00		9:00		9:00
	生理食塩液	50mL								
No.10	フィジオ140輸液	2000mL	持続点滴末梢	10時間で		9:15		9:15		9:15

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	200mg
No.6	シスプラチン注	40mg/m ²	40mg/m ²

備考
放射線併用 アプレピタント内服