レジメン名：TC＋Durvalumab療法（化療期）

静岡県立静岡がんセンター

2025年3月27日 改訂

婦人科　　対象疾患：子宮体がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	イミフィンジ点滴静注	1120mg	持続点滴末梢	1時間で	10:00		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:00		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	6mL	持続点滴末梢	15分で	11:05		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	15分で	11:20		
No.6	パクリタキセル注	175mg/㎡	持続点滴末梢	3時間で	11:35		
	生理食塩液	500mL					
No.7	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	持続点滴末梢	1時間で	14:35		
	生理食塩液	250mL					
No.8	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	15:35		

インターバル日数：21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	イミフィンジ点滴静注	1120mg	1120mg
No.6	パクリタキセル注	175mg/㎡	175mg/㎡
No.7	カルボプラチン点滴静注液	AUC6	900mg/body

備考
Jelliffeの式を用いてCCrを算出