レジメン名：GEM+CBDCA+Bev療法

静岡県立静岡がんセンター

2025年6月5日 改訂

婦人科　　対象疾患：卵巣がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（8）	day（ ）
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	点滴末梢	15分で	10:00		
	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL					
No.2	ベバシズマブBS点滴静注	15mg/kg	点滴末梢	90分で	10:15		
	生理食塩液	100mL		2回目60分で			
				3回目以降30分で			
No.3	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/㎡	点滴末梢	30分で	11:45		
	生理食塩液（一次溶解液）						
	ソルデム3A輸液	200mL					
No.4	カルボプラチン点滴静注液	AUC4	点滴末梢	90分で	12:15		
	生理食塩液	250mL					
No.5	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	50mL	点滴末梢	15分で		10:00	
No.6	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/㎡	点滴末梢	30分で		10:15	
	生理食塩液（一次溶解液）						
	ソルデム3A輸液	200mL					
No.7	生理食塩液	50mL	点滴末梢	5分で	13:45	10:45	

インターバル日数：21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	ベバシズマブBS点滴静注	15mg/kg	15mg/kg
No.3	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/㎡	1000mg/㎡
No.4	カルボプラチン点滴静注液	AUC4	600mg/body
No.6	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/㎡	1000mg/㎡

備考
Jelliffeの式を用いてCCrを算出