レジメン名：XELOX/SOX+Tmab+Pembrolizumab療法（初回）

静岡県立静岡がんセンター

2025年11月17日 改訂

消化器内科　　対象疾患：胃がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day（1）	day（ ）	day（ ）
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	持続点滴末梢	30分で	10:00		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	10:30		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	30分で	10:35		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:05		
No.6	トラスツズマブBS点滴静注用	8mg/kg	持続点滴末梢	90分で	11:10		
	注射用水（一次溶解液）						
	生理食塩液	250mL					
No.7	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:40		
No.8	エルプラット点滴静注液	130mg/㎡	持続点滴末梢	2時間で	12:45		
	5%ブドウ糖液	500mL					
No.9	5%ブドウ糖液	50mL	持続点滴末梢	5分で	化学療法終了後		

インターバル日数：　21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	キイトルーダ点滴静注	200mg	200mg
No.6	トラスツズマブBS点滴静注用	8mg/kg	8mg/kg
No.8	エルプラット点滴静注液	130mg/㎡	130mg/㎡

備考
XELOX+Tmab＋Pembrolizumab ゼローダ　2000mg/㎡/日、分2（朝、夕食後） 2週間内服　1週間休薬 SOX+Tmab＋Pembrolizumab ティーエスワン　80mg/㎡/日、分2（朝、夕食後） 2週間内服　1週間休薬