

レジメン名 : (AEGEAN) CBDCA+GEM+Durvalumab療法 (30kg未満)

静岡県立静岡がんセンター
2025年11月13日 改訂

呼吸器内科 対象疾患: 非小細胞肺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day()
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	イミフィンジ点滴静注	20mg/kg	持続点滴末梢	1時間で	10:00		
	生理食塩液	250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:00		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	1mL	持続点滴末梢	30分で	11:05		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL	50mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:35		
No.6	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²	持続点滴末梢	30分で	11:40		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	ソルデム3A輸液	200mL					
No.7	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	持続点滴末梢	60分で	12:10		
	生理食塩液	250mL					
No.8	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	13:10		
No.9	デキサート注射液3.3mg/mL	2mL	持続点滴末梢	15分で		10:00	
	生理食塩液	50mL					
No.10	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²	持続点滴末梢	30分で		10:15	
	生理食塩液(一次溶解液)						
	ソルデム3A輸液	200mL					
No.11	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で		10:45	

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	イミフィンジ点滴静注	20mg/kg	20mg/kg
No.6	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²	1000mg/m ²
No.7	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	750mg
No.10	ゲムシタビン点滴静注用	1000mg/m ²	1000mg/m ²

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出