

レジメン名 : (AEGEAN) CBDCA+PEM+Durvalumab療法 (30kg未満)

静岡県立静岡がんセンター
2025年11月13日 改訂

呼吸器内科

対象疾患: 非小細胞肺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:00		
No.2	イミフィンジ点滴静注	20mg/kg	持続点滴末梢	1時間で	10:00		
	生理食塩液	250mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:00		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	1mL	持続点滴末梢	30分で	11:05		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.5	アリムタ注射用	500mg/m ²	持続点滴末梢	360mL/h	11:35		
	生理食塩液(一次溶解液)						
	生理食塩液	30mL					
No.6	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	持続点滴末梢	60分で	11:45		
	生理食塩液	250mL					
No.7	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	12:45		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	イミフィンジ点滴静注	20mg/kg	20mg/kg
No.5	アリムタ注射用	500mg/m ²	500mg/m ²
No.6	カルボプラチン点滴静注液	AUC5	750mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 初回投与7日以上前より 葉酸(パンビタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎