

レジメン名:術前Durva+GC療法

静岡県立静岡がんセンター

2026年1月26日 改訂

泌尿器科 対象疾患:膀胱がん

| 通しNo | 商品名・規格 | 投与量 | 手技・投与ルート | 点滴時間・速度 | day(1) | day(2) | day(3) | day(4) | day(8) |
|-------|-----------------------|-----------------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| No.1 | 生理食塩液 | 50mL | プライミング | | 12:10 | | | | |
| No.2 | イミフィンジ点滴静注 | 1500mg | 持続点滴末梢 | 1時間で | 12:10 | | | | |
| | 生理食塩液 | 250mL | | | | | | | |
| No.3 | 生理食塩液 | 50mL | 持続点滴末梢 | 5分で | 13:10 | | | | |
| No.4 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg50mL | 50mL | 持続点滴末梢 | 15分で | 13:15 | | | | 10:00 |
| No.5 | ゲムシタピン点滴静注液 | 1000mg/m ² | 持続点滴末梢 | 30分で | 13:30 | | | | 10:15 |
| | ソルデム3A輸液 | 200mL | | | | | | | |
| No.6 | ソルデム3A輸液 | 1000mL | 持続点滴末梢 | 20時間で | 14:00 | | | | |
| | 生理食塩液 | 1000mL | | | | | | | |
| No.7 | ソルデム3A輸液 | 500mL | 持続点滴末梢 | 3時間で | | 10:00 | | | |
| | 生理食塩液 | 500mL | | | | | | | |
| No.8 | デキサート注射液3.3mg/mL | 3mL | 持続点滴末梢 | 30分で | | 13:00 | | | |
| | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL | 50mL | | | | | | | |
| No.9 | マンニトールS注射液15% | 100mL | 持続点滴末梢 | 30分で | | 13:30 | | | |
| No.10 | シスプラチン注 | 70mg/m ² | 持続点滴末梢 | 1時間で | | 14:00 | | | |
| | 生理食塩液 | 200mL | | | | | | | |
| No.11 | マンニトールS注射液15% | 200mL | 持続点滴末梢 | 1時間で | | 15:00 | | | |
| No.12 | ソルデム3A輸液 | 500mL | 持続点滴末梢 | 3時間で | | 16:00 | | | |
| | ラクテック注 | 500mL | | | | | | | |
| No.13 | ソルデム3A輸液 | 1000mL | 持続点滴末梢 | 15時間で | | 19:00 | | | |
| | ラクテック注 | 1500mL | | | | | | | |
| No.14 | デキサート注射液3.3mg/mL | 2mL | 持続点滴末梢 | 15分で | | | 10:00 | 10:00 | |
| | 生理食塩液 | 50mL | | | | | | | |
| No.15 | ソルデム3A輸液 | 1000mL | 持続点滴末梢 | 24時間で | | | 10:00 | | |
| | ラクテック注 | 2000mL | | | | | | | |
| No.16 | ソルデム3A輸液 | 1000mL | 持続点滴末梢 | 24時間で | | | | 10:00 | |
| | ラクテック注 | 1000mL | | | | | | | |
| No.17 | 生理食塩液 | 50mL | 持続点滴末梢 | 5分で | | | | | 10:45 |

インターバル日数: 21日

| 通しNo | 商品名 | 標準値 | 上限値 |
|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| No.2 | イミフィンジ点滴静注 | 1500mg | 1500mg |
| No.5 | ゲムシタピン点滴静注液 | 1000mg/m ² | 1000mg/m ² |
| No.10 | シスプラチン注 | 70mg/m ² | 70mg/m ² |
| | | | |
| | | | |

| 備考 |
|---|
| アブレビタント内服 体重30kg以下の場合 1回投与量は20mg/kgとする |