

レジメン名 : (EMPOWER-Lung 3) CBDCA+PTX+Cemiplimab療法

静岡県立静岡がんセンター
2026年1月14日 改訂

呼吸器内科

対象疾患: 非小細胞肺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()
No.1	生理食塩液	50mL	プライミング		10:30		
No.2	リブタヨ点滴静注	350mg	持続点滴末梢	30分で	10:30		
	生理食塩液	100mL					
No.3	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	11:00		
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	6mL	持続点滴末梢	30分で	11:05		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	15分で	11:35		
No.6	パクリタキセル注	200mg/m ²	持続点滴末梢	3時間で	11:50		
	生理食塩液	500mL					
No.7	カルボプラチニ点滴静注液	AUC6	持続点滴末梢	1時間で	14:50		
	生理食塩液	250mL					
No.8	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	15:50		

インターバル日数: 21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	リブタヨ点滴静注	350mg	350mg
No.6	パクリタキセル注	200mg/m ²	200mg/m ²
No.7	カルボプラチニ点滴静注液	AUC6	900mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出