

# レジメン名：リブロファズ＋CBDCA＋peme療法（1c、80kg未満）

静岡県立静岡がんセンター  
2026年6月18日 改訂

呼吸器内科

対象疾患：非小細胞肺がん

通しNo	商品名・規格	投与量	手技・投与ルート	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
No.1	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	持続点滴末梢	30分で	9:00		
	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	50mL					
	アロカリス点滴静注235mg10mL	10mL					
No.2	ペトレキセド点滴静注液	500mg/m <sup>2</sup>	持続点滴末梢	360mL/h	9:30		
	生理食塩液	30mL					
No.3	カルボプラチン注射液	AUC5	持続点滴末梢	1時間で	9:35		
	生理食塩液	250mL					
No.4	デキサート注射液3.3mg/mL	3mL	持続点滴末梢	15分で	10:35		
	ファモチジン注射液20mg	20mg					
	ポララミン注5mg1mL	5mg					
	アセリオ静注液1000mg/100mLバッグ	100mL					
No.5	生理食塩液	50mL	持続点滴末梢	5分で	10:50		
No.6	リブロファズ配合皮下注	1600mg	皮下注射	5分で	10:55		
No.7	リブロファズ配合皮下注	2400mg	皮下注射	5分で		9:00	9:00

インターバル日数：21日

通しNo	商品名	標準値	上限値
No.2	ペトレキセド点滴静注液	500mg/m <sup>2</sup>	500mg/m <sup>2</sup>
No.3	カルボプラチン注射液	AUC5	750mg
No.6	リブロファズ配合皮下注	1600mg	1600mg
No.7	リブロファズ配合皮下注	2400mg	2400mg

備考
Cockcroft and Gaultの式を用いてCCrを算出 初回投与7日以上前より 葉酸(パンビタン末 1g) 1日1回 連日内服 ビタミンB12 1mg 筋注 9週間毎 day8、15は投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬を内服